

Celleforandringer

Hvad er celleforandringer

Celleforandringer er ikke kræft, men kan være et forstadium til livmoderhalskræft. Celleforandringer kan heldigvis nemt behandles lang tid før denne udvikling sker.

Celleforandringer skyldes en infektion med HPV (human papilloma virus), og celleforandringer betyder, at der er virus i nogle af cellerne på livmoderhalsens slimhinde.

Man inddeler celleforandringer i 4 forskellige grader afhængig af, hvor udbredt virusinfektionen er. De lette celleforandringer forsvinder ofte af sig selv, hvorimod svære forandringer kræver behandling.

Undersøgelse af livmoderhalsen

Hvis dit celledrag ikke er normalt eller hvis du har kontaktblødning anbefales du at få lavet en kikkertundersøgelse af livmoderhalsen (kolposkopi), hvor der tages små vævsprøver (biopsier) fra livmoderhalsens slimhinde. Prøvetagningen er oftest smertefri, men kan give lidt svie.

Efter undersøgelsen

Du kan bløde lidt i op til en uge efter prøvetagningen og du kan have let murrende smerte i underlivet det første døgn, som du kan lindre med håndkøbsmedicin.

Forebyg infektion

Så længe du bløder, bør du undgå karbad, hav- og søbad, samleje og brug af tampon for at forebygge infektion.

Risikoen for komplikationer efter biopsitagning er meget lille. Hvis du får smerter, kraftig blødning, ildelugtende udflåd eller feber, skal du kontakte klinikken eller en vagtlæge.

Prøvesvar

Du vil få svar på undersøgelsen af biopsierne på mail eller på anden måde, hvilket vi aftaler.

Hvis der påvises lette celleforandringer, aftales kontrol i vores klinik eller hos din egen læge.

Hvis der påvises middelsvære celleforandringer, vil kontrollen afhænge af, om du fortsat har ønske om børn. Du kan enten blive anbefalet kontrol i klinikken efter 6 måneder, eller du kan få lavet et keglesnit.

Ved svære celleforandringer anbefales alle at få lavet et keglesnit.